

《醫學人生》執業醫生與您分享醫學、人生與愛的故事，逢週一刊登

阿麗三十三歲，順產生了兩個兒子後，發現有痔瘡的毛病。偶爾排便時會出血，但流血很快自然停止，亦不覺得痛。今天到我診所來，因過去兩、三天痔瘡病患又發作。每次排便都出血，而且血量比以往多，出血時間也較長，排便期間特別疼痛，令她很不願如廁。我有點奇怪，一般痔瘡形成是由肛管末端靜脈血管腫脹形成的，不應覺痛，除非有併發症，如發炎、化膿等。檢查時，發現有一條幼小而豎立著的東西橫卡在肛管中。用小手術鉗把它取出，竟是一條25毫米長的魚骨。阿麗也不知何時把魚骨吞下，發展成今天這地步。數天後，她已完全康復了。然而，因為魚骨在肛管引發周邊組織纖維化，間接治好了她的痔瘡，免去做切除手術，也算是「錯有錯著」。

痔瘡根據其嚴重性一般分作四期：第一期是內痔，主要病徵是大便帶鮮色血，因為是靜脈血管出血；第二期腫脹擴大，偶會突出肛門外，不過很快會自然地退回肛管。這兩期的治療方法是改善飲食及大便習慣，外用藥物，並可以注射硬化劑，在痔瘡內周圍引發纖維化，把痔瘡治癒(阿麗因魚骨令痔瘡附近引起此現象，不覺間治癒了)。第三期患者排便時，痔瘡都會脫垂到肛門外，但可以用手把脫垂部份推回直腸內；第四期患者的痔瘡長期顯露體外，不能推回直腸內。第三期和第四期要根治，按傳統方法必須用手術割除，而近年加入了環狀痔瘡切除術。傳統方法是把脫垂的部份連外皮一同割去，傷口顯露在肛門口，非常痛楚。環狀痔瘡槍則是把供應痔瘡的血管和組織環狀切除後，將脫垂部份拉回原處並縫合；縫合位置是在肛管之上，外面沒有傷口，大大減輕痛楚。這器材的發明真是患者的「福音」。

「神卻揀選了世上愚笨的…也揀選了世上軟弱的…他也揀選了世上卑賤的和被人輕視的，以及算不得甚麼的…使所有的人在 神面前都不能自誇。」(哥林多前書1:27-29,聖經新譯本)

杏林園丁/外科



環球天道傳基協會

Tien Dao Worldwide Christian Media Association

如對文章有任何回應或查詢，歡迎登入《醫學人生》
網頁分享<http://www.tdww.org.hk/cmdff/index.html>



香港基督徒醫生及牙醫團契
The Christian Medical and
Dental Fellowship of Hong Kong